

小儿隐球菌病\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_8F\\_E5\\_84\\_BF\\_E9\\_9A\\_90\\_E7\\_c22\\_609164.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E9_9A_90_E7_c22_609164.htm) 隐球菌病是亚急性或慢性肉芽肿性传染病，以侵犯中枢神经系统为主，亦可累及肺、皮肤、骨骼和其他内脏、组织等。该菌常存在于土壤、动植物的表面、正常人的皮肤和粪便中。一般认为该菌可经呼吸道或皮肤破损处侵入人体，借血行散播。

**【诊断】**（一）临床表现1．中枢神经系统隐球菌病临床表现与结核性脑膜炎相似，若隐球菌性肉芽肿限于脑或脊髓的某个部位，则与脑瘤或脑脓肿相似。起病缓慢，开始多为轻度阵发性头痛，经常反复并伴有恶心、呕吐或眩晕，发热可轻可重。经数周至数月后出现颅压增高和脑膜刺激征以及各种眼部征象。经3~6个月趋于恶化，出现偏瘫、失语、共济失调、精神障碍，以至抽风昏迷，最后死于呼吸衰竭。偶有2年以上仍反复发作而不愈者。2．肺隐球菌病常于中枢神经系统隐球菌病时并发。表现为低热、咳嗽、胸痛等。部分患者可无症状而于x线检查时发现。（二）实验室及其他检查1．脑脊液压力增高，外观微混，白细胞 $50 \sim 500 \times 10^6/l$ ，主要为淋巴细胞，隐球菌往往混杂其中，蛋白明显增高而糖与氯化物降低。墨汁染色可发现具有肥厚荚膜的圆形或椭圆形的隐球菌。用沙保培养基培养可见奶白色、粘液样、光亮的集落。2．肺隐球菌病可从痰液中找隐球菌。3．x线检查肺隐球菌病时可见两肺浸润阴影或有单个、多个结节状阴影。4．乳胶凝集试验可检测隐球菌荚膜多糖体抗原，约95%以上本病患者可从脑脊液或血清中检出。**【治疗】**（一）两性霉素b全身用药

同“念珠菌病”，但必需加用鞘内注射。开始每次用0.011mg，溶于2~3ml脑脊液或注射用水稀释缓慢注入，以后渐增至0.1~0.5mg，总疗程为20~30次。鞘内注射可与静脉注射交替使用，使毒性及药物反应减轻。

(二) 二脒  
按5mg/(kg·d)加入10%葡萄糖液中静滴，于2~4小时滴入，疗程1个月。药物反应较二性霉素为轻，用药时需定期查肝、肾功能。

(三) 5-氟胞嘧啶临床常与二性霉素b联合应用。剂量为50~100mg/(kg·d)，分4次服用，疗程为3~8周。亦可引起胃肠道反应，偶见皮疹、药物热、白细胞减少或转氨酶升高。

(四) 大蒜素剂量和用法同“念珠菌病”。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)