

幼年型乳头状瘤\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B9\\_BC\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9E\\_8B\\_E4\\_c22\\_609176.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B9_BC_E5_B9_B4_E5_9E_8B_E4_c22_609176.htm) 喉部的良性肿瘤. 幼年型乳头状瘤由人类乳头状病毒引起. 可在1岁前出现. 引起声音嘶哑(进一步发展为失音)和上呼吸道阻塞. 上呼吸道梗阻以呼吸喘鸣以及肋间隙, 锁骨上, 胸骨上, 剑突下的凹陷为特征. 肿瘤可以在多个部位快速增生, 需要气管切开以维持呼吸道通畅. 诊断可通过直接喉镜进行, 并由组织病理学检查确认. 治疗是定期的切除或激光汽化. 使用干扰素可以获得缓解, 但药物撤除后易于复发. 幼年型乳头状瘤常见有复发, 但到青春期时常自行消退. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)