

耳廓假囊肿_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_80_B3_E5_BB_93_E5_81_87_E5_c22_609182.htm 耳廓假性囊肿，亦称为软骨间积液或浆液性软骨膜炎。病因未明，是一种软骨膜无菌性炎性反应。其积液不在软骨膜下，而是在耳廓软骨间。

【诊断】一、多无自觉症状，时有局部痒、麻、胀感。或触痛。二、发生于耳廓前外侧上部，如三角窝、舟状窝或耳甲腔处，一般单发，偶有多发者。三、肿物常呈半球形隆起，界限清楚，表面皮肤色泽正常。肿物较小时触之较硬，较大者有液体波动感。四、穿刺可抽出黄色液体，细菌培养阴性。其液体蛋白质含量较高，内无红细胞或炎细胞。液体抽尽后，囊肿可在数小时或数日内形成。五、透照试验，囊肿可透光，这可与实质性肿物及血肿相鉴别。**【治疗】**一、理疗

：对少量积液者，可用超短波或紫外线治疗，以制止渗液和促使吸收，隔日一次。有效者，肿胀消退后，仅留皮肤增厚。也可用磁疗、冷冻疗法。二、穿刺抽液：积液较多者多用此法，抽出液体后，用石膏或牙模胶固定压迫两侧，然后加压包扎之，疗效较好。三、穿刺抽液后，腔内注入硬化剂或15%高渗盐水，不加压包扎。四、切开引流，要谨慎，要严密消毒，以防绿脓杆菌等继发感染。本病预后良好，可遗有局部增厚，如有继发感染引起化脓性软骨膜炎，需抗炎治疗以减轻耳廓畸形。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com