

坏死性外耳道炎\_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9D\\_8F\\_E6\\_AD\\_BB\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_c22\\_609185.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_9D_8F_E6_AD_BB_E6_80_A7_E5_c22_609185.htm) 坏死性外耳道炎亦称恶性外耳道炎，不常见。多发生于老年糖尿病患者或抵抗力低下者，常为单侧发病，无性别差异，致病菌为绿脓杆菌。[诊断要点] 1. 耳痛剧烈伴有流脓，病情呈进行性发展。随着病变累及部位不同而出现相应的临床表现，若累及颅底可有颅底骨髓炎、脑脓肿、多发性脑神经瘫痪(w、d、x)及咽后脓肿。 2. 检查可见外耳道皮肤糜烂继而有肉芽组织增生，耳周软组织肿胀，压痛明显。脓液培养有绿脓杆菌生长。血糖和糖耐量测定有诊断价值。x线断层照片可提供病变范围。血沉增快。应注意与恶性肿瘤鉴别。[治疗] 1. 该病有赖于早期诊断，严格控制血糖水平，提高机体免疫力，给予强力有效的全身性抗菌药物4-6周，如羧苄青霉素、多粘菌素b及头孢菌素等。 2. 局部需彻底清除脓液及肉芽组织，并尽早做根治性清创手术。此病预后较差，尤其出现面瘫及多发性脑神经瘫者预后更差，故应早期诊断与治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)