

化脓性耳廓软骨膜炎\_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8C\\_96\\_E8\\_84\\_93\\_E6\\_80\\_A7\\_E8\\_c22\\_609186.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_8C_96_E8_84_93_E6_80_A7_E8_c22_609186.htm) 急性化脓性软骨膜炎是一严重的外耳疾病，多由外伤，手术针灸等使致病菌侵入所致进行性软骨坏死。致病菌以绿脓杆菌及葡萄菌居多。【诊断】一、早期有耳灼热感，继而局部肿胀、疼痛，并迅速加剧，呈持续性痛，用一般止痛药物也难以制止，全身不适，并有发热。二、见耳廓红肿、增厚、触之坚实而缺乏弹性、触痛明显。有脓肿形成时，耳廓表面呈暗红色，或有局限性隆起，或有波动感。脓肿破溃后，疼痛减轻，可形成瘻管长期不愈。【治疗】一、及时、足量使用抗生素药物。多为绿脓杆菌感染，应选用有效抗生素，也可根据细菌培养及药物敏感试验的结果选用药物。二、早期可局部热敷，改善血液循环。也可用4%醋酸铝湿敷；可用紫外线、超短波照射等，以减轻局部炎症。三、脓液形成时，应立即切开引流。术中将耳廓软骨坏死部分切除或刮除，以免感染波及全部软骨，造成严重畸形。四、愈合可对耳部畸形行成形术。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)