

耳带状疱疹\_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_B3\\_E5\\_B8\\_A6\\_E7\\_8A\\_B6\\_E7\\_c22\\_609188.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_80_B3_E5_B8_A6_E7_8A_B6_E7_c22_609188.htm) 耳带状疱疹是由于水痘一带状疱疹病毒侵犯与耳相关的颅神经而发病。常见诱因因为受凉、劳累、病灶感染、机体抵抗力低下等。本病多为一侧发病。【诊断要点】病人多于受凉或劳累后初感低热、头痛和食欲不振，继而出现患侧耳部剧痛，随后于耳廓前方、外耳道及鼓膜的表面出现散在的淡红色丘疹，渐成多数薄壁小疱，内含血清，后期小疱渐自行破溃或融合成大疱而破溃，最后结痂愈合。病程中可同时伴有耳聋、面瘫、前庭刺激症状以及迷走神经受累等多个颅神经被侵犯的症征，借此可与耳单纯疱疹相鉴别。【治疗】目前尚无特殊药物治疗。可选用针灸、电针和理疗等方法促进面瘫恢复。同时肌注维生素b1每日100mg，维生素b12每日250mg。耳痛剧烈者可服用镇痛剂。水疱破溃后可局部涂抹金霉素软膏、磺胺粉剂等，以预防继发感染。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)