

外耳道疔肿_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_A4_96_E8_80_B3_E9_81_93_E7_c22_609192.htm 外耳道疔也称局限性外耳道炎，发生于外耳道外1/3的外耳道软骨部。【诊断】一、临床表现（一）主要症状是跳动性耳痛，张口、咀嚼、打呵欠时疼痛加重，常放射到头部，影响睡眠。婴儿不会说，表现为哭闹不安，触患耳更甚。（二）疔肿位于外耳道后壁者炎症可向耳后扩散而肿胀，使耳后沟消失，或乳突皮肤红肿，可误认为急性乳突炎。（三）发病5~6日后，疔肿溃破，外耳道流出少许血脓，耳痛随之减轻。二、检查要点（一）见外耳道软骨部有单个或多个小疔，初起皮肤局限性红肿，触痛明显，牵拉耳廓后耳屏疼痛更加明显。此点可与急性中耳炎鉴别，中耳炎无耳廓牵拉痛。（二）外耳道疔并发耳后脓肿，系耳后淋巴结化脓所致，其位置在乳突骨膜下，应与急性乳突炎引起乳突骨膜下脓肿鉴别。x线摄片可见乳突炎时乳突气房明显混浊或有骨质破坏，而外耳道疔乳突片正常。【治疗】一、耳部热敷、理疗，如紫外线等。二、选用敏感抗生素。三、10%鱼石脂甘油纱条填塞外耳道，每日更换1~2次。四、对疼痛剧烈者给予止痛药，也可用3%酚甘油滴耳。五、疔肿自行溃破时，周围清洁消毒，取出脓栓，置棉条引流。如破口小时，也可用刀尖扩大创口。注意切口应沿外耳道长轴方向切开，以免外耳道狭窄。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com