

粘连性中耳炎_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_B2_98_E8_BF_9E_E6_80_A7_E4_c22_609205.htm

粘连性中耳炎是各种急、慢性中耳炎未经治疗或治疗不当所致的中耳内纤维增生，或瘢痕形成所致的一种后遗症。【诊断】一、临床表现（一）听力减退：一般为传音性聋，也可为混合性聋。（二）耳鸣。二、检查要点（一）耳镜检查，鼓膜明显内陷、增厚或菲薄、瘢痕、钙斑等。（二）鼓气耳镜检查：鼓膜活动度消失或减弱。（三）咽鼓管通畅度检查：咽鼓管阻塞或狭窄。（四）声阻抗检查：鼓室功能曲线呈平坦型。（五）乳突x线检查：多显示乳突气化不良。三、鉴别诊断本病须与耳硬化症鉴别。耳硬化症无中耳炎病史，常见韦氏误听，鼓膜正常，咽鼓管通气功能良好，乳突x线片多呈气化型，音叉盖来氏试验阴性。【治疗】一、早期轻者，行咽鼓管吹张术及鼓膜按摩术，或咽鼓管探条扩张术等。二、粘连久而重者，需行手术治疗，如鼓室探查、粘连分离术，或镫骨手术和内耳开窗术等。三、可配戴助听器，以提高听力。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com