

鼻疔_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_BC_BB_E7_96_96__E8_80_B3_c22_609232.htm 鼻前庭或鼻尖、鼻翼处的毛囊、皮脂腺或汗腺的局限性急性化脓性炎症，多为单侧。

【诊断】一、常因挖鼻、拔鼻毛等导致皮肤损伤，金黄色葡萄球菌侵入感染所致，糖尿病及全身抵抗力差者易患或反复发作。二、鼻疔的局部有红、肿、热、痛，疔肿成熟后顶部出现黄色脓点，多于一周后自行破溃流脓而愈。三、严重病例可引起上唇及面颊部蜂窝织炎，及经内眦静脉、眼静脉达海绵窦而引起海绵窦血栓性静脉炎，出现畏寒、高热、头痛、全身不适等症状，病侧眼睑及结膜水肿，眼球突出、固定甚至失明。

【治疗】一、早期可用3%碘酒局部涂抹。二、治疗过程中严禁挤压疔肿，未成熟时可用热敷或氩-氛激光局部照射，促进疔肿消散，成熟后可用尖刀或针头挑破脓头，利于脓液排出。三、足量抗生素应用，如红霉素、头孢菌素、磺胺类药物应用，疼痛剧烈时可给予镇痛剂。四、有并发症者须住院治疗。合并海绵窦血栓性静脉炎者，给予大量抗生素等药物，及请眼科和神经科专科医师治疗，切不可疏忽。五、多次发作者应排除糖尿病等疾病。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com