

鼻结核\_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E9\\_BC\\_BB\\_E7\\_BB\\_93\\_E6\\_A0\\_B8\\_\\_c22\\_609240.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_BC_BB_E7_BB_93_E6_A0_B8__c22_609240.htm) 鼻结核是一种鼻部结核菌感染疾病。有原发性与继发性之分，原发者可能是空气传播、直接或间接接触造成，继发者多由肺结核病灶或其他部位结核引起。鼻结核发病率低，需认真检查，早期诊断妥善治疗。 诊断要点 1．早期症状常很轻微，可仅有鼻前部瘙痒，烧灼感，少量渗液。病变发展，分泌物增多，可有涕中带血，出现不同程度鼻塞，鼻出血，嗅觉障碍。侵及鼻窦则有头昏、头痛等鼻窦炎表现。可有眼部不适，流泪，耳鸣耳溢等。严重者可有消瘦、发烧等全身症状。 2．早期见鼻前庭湿疹或毛囊炎病变。可有鼻前部皮肤及粘膜粉红色小结节。常可见鼻腔内有痂皮，其下粘膜浅表溃疡，边缘不整，溃疡处有苍白色肉芽组织增生，触之易出血。严重者见溃疡深，有坏死，中隔穿孔。应检查肺及其他部位找出病灶，可做结核菌素试验、鼻分泌物培养等，活检可确诊。需与鼻前庭湿疹、鼻腔单纯溃疡、梅毒、肿瘤、硬结病等鉴别。治疗加强营养，全身应用抗结核药物，可同时使用链霉素、对氨基水杨酸、异烟肼。局部也可用抗结核药物滴鼻。溃疡、出血部位可用腐蚀剂或电灼处理。局限性肉芽肿可行简单刮除术，并用抗结核药物等局部涂敷 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)