

鼻息肉及鼻息肉病_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_BC_BB_E6_81_AF_E8_82_89_E5_c22_609243.htm 鼻息肉鼻息肉为非真性肿瘤一般常由鼻粘膜变态反应性水肿，慢性炎症刺激性水肿，花生四烯酸代谢障碍等多种因素所致，其好发于副鼻窦复合体处，双侧多见。【诊断】一、持续性鼻塞，嗅觉减退，阻塞性鼻音。带蒂息肉，坠入鼻腔下部，常感有移动性肿块。二、鼻腔分泌物多，若合并有副鼻窦炎常有脓涕头痛。三、后鼻孔息肉可有呼气性鼻阻塞，若咽鼓管口受阻可引起卡它性中耳炎。四、局部检查：鼻外形改变蛙鼻，鼻内息肉淡红或灰白（如荔枝肉状）半透明肿物，柔软不痛可移动，一般不易出血，对麻黄素或肾上腺素能收敛。鼻镜、后鼻镜或内窥镜检查对明确息肉根部部位范围有重要意义。x光片或ct水平位冠状位扫描对鼻腔鼻窦检查实属必要。五、鉴别诊断：特别是单侧时应与鼻腔内翻性乳头状瘤、鼻腔鼻咽纤维血管瘤、鼻腔恶性肿瘤、脑膜鼻膨出鉴别。【治疗】一、改变机体变态反应状况。二、手术切除息肉（单纯性）。三、针对病因治疗：矫正偏曲的鼻中隔，摘取息肉，切除钩突，开放筛窦或行筛上颌窦联合根治术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com