

鼻出血\_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E9\\_BC\\_BB\\_E5\\_87\\_BA\\_E8\\_A1\\_80\\_\\_c22\\_609269.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_BC_BB_E5_87_BA_E8_A1_80__c22_609269.htm) 又称鼻衄，是鼻腔疾病的常见症状之一，由全身疾病引起，偶有因鼻腔邻近病变出血经鼻腔流出者。其原因很多，可分为局部及全身病因两大类，出血部位大多数发生在鼻中隔前下方易出血区（little区或kiesselbach区），40岁以上者多见下鼻道后端的鼻-鼻咽静脉丛。【诊断】询问病史，清除鼻腔凝血块，详细检查鼻腔，明确出血部位，及时采取有效止血措施。如出血较多，可用浸有0.1%肾上腺素棉片置入鼻腔，压迫鼻翼，数分钟后取出棉片，出血减少再行检查。【治疗】一、根据病情患者取坐位或半坐位，疑有休克时，可取平卧低头位，对紧张者予以安慰，必要时给以镇静剂，迅即开始止血。如未出血或经一般局部处理后出血已止，详细询问病史，进行周密的局部及全身检查以明确出血原因及部位，从而进行病因治疗及局部处理。二、止血：寻找出血点，如血量多，无法发现出血点者，立即采取适当措施止血。（一）简易止血法：鼻中隔前下方易出血区出血时，可自行捏紧两侧鼻翼10~15分钟。并取头低位、冷敷前额部或浸以1%麻黄素生理盐水棉片塞入鼻腔。（二）烧灼法：出血量不多，可见出血点时采用此法。1. 药物烧灼法：用30%~50%硝酸银、30%三氯乙酸或铬酸球烧灼出血点。2. 电烧灼法。3. 激光凝固法。（三）冷冻止血法。（四）填塞法：出血较剧，渗血面较大时用。1. 明胶止血海绵或纤维蛋白绵等，其上可加止血药粉。2. 鼻腔填塞法：以凡士林纱条或碘仿纱条填入鼻腔。3

. 后鼻孔填塞法。4 . 气囊或水囊压迫止血。三、全身治疗（一）针对病因治疗，必要时请有关科室会诊。（二）止血药：安络血5mg每日3次。（三）维生素c、k4、p等。（四）镇静剂。（五）失血过多或已出现休克者可输血或补液。四、必要时手术结扎血管：颈外动脉结扎术；上唇动脉结扎术；筛动脉结扎术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)