

喉梅毒_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_96_89_E6_A2_85_E6_AF_92__c22_609315.htm

喉梅毒是梅毒螺旋体的喉部感染，比较少见，先天性梅毒和后天性梅毒均可发生于喉部，先天性梅毒发生于喉部者更少见，常发生于生后数月或青春期，后天性喉梅毒多见于中年男性患者。【诊断】一、有家族史或冶游史。二、喉部症状有声哑，咳嗽咳痰带血，吞咽障碍或呼吸困难，多数无疼痛或疼痛轻微。三、主要发病部位为会厌，并由此向会厌皱襞、杓状软骨、室带及声带扩展，表现为梅毒瘤性肿块、溃疡、弥漫性增生、软骨坏死及瘢痕形成等，可见多种病变共存。四、咽部或其他部位可发现梅毒症状。五、早期梅毒涂片可找到梅毒螺旋体。六、梅毒血清学检查呈阳性反应。七、鉴别诊断（一）喉癌：多发生于老年男性患者，梅毒血清学反应阴性，病理检查可作鉴别。（二）喉结核：肺部常有活动结核，病变多在喉后部，全身症状明显，痰可查到结核杆菌，病理可作出鉴别。（三）结核、梅毒和癌肿有时可同时发生于喉部，诊断中出现疑问时应注意这一点。【治疗】一、驱梅治疗：可用青霉素疗法，对青霉素过敏者用红霉素治疗。二、一般治疗：卧床休息，禁声，注意营养及维生素的补充。三、局部治疗：保持局部清洁卫生。四、对症治疗：有呼吸困难时需作气管切开；伴继发感染有疼痛时对症止痛；形成喉狭窄时应作相应的治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com