

喉结核_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_96_89_E7_BB_93_E6_A0_B8__c22_609316.htm 喉结核为结核杆菌引起的喉部感染，绝大多数喉结核继发于肺结核，特别是开放性肺结核。喉的结核感染可发生局部浸润、溃疡形成、结核性肉芽肿或称结核瘤，也可产喉的软骨膜炎。【诊断】一、肺结核，特别是开放性结核患者，出现喉部症状如：咽喉发干、灼热、声哑、咳嗽、咽喉疼痛、吞咽困难或呼吸困难。二、早期可见杓间区粘膜粗糙增厚，一侧声带粘膜粗糙或水肿，声带运动减弱。以后出现溃疡，逐渐侵及双侧声带、室带及会厌，水肿明显时可引起呼吸困难。三、若为肉芽增生型，则形成乳头瘤样肿块，晚期可见深在的溃疡及坏死，周围组织水肿明显。四、全身有活动结核表现：发热、咳嗽、咳痰带血、胸痛、消瘦贫血等。五、痰可找到结核杆菌，血沉加快。六、病理检查可见典型结核改变。七、鉴别诊断（一）喉癌：结核瘤与喉癌外观极相似，喉癌肺部可无结核病灶，病理检查可作出鉴别。（二）喉梅毒：病人一般情况较好，不发热，病变多在喉前部，梅毒血清反应阳性，病变涂片可找到梅毒螺旋体。（三）喉麻风：见于晚期麻风病人，常有鼻部麻风，病理检查可鉴别。【治疗】一、抗结核药：链霉素肌肉注射，口服异烟肼及对氨基水杨酸钠，及新抗结核药。二、局部可用链霉素雾化治疗，禁声使喉部充分休息。三、支持疗法：保证营养、水分：电解质的摄入及各种维生素的补充。四、对症治疗：如相应的止痛方法及退热等。五、呼吸道隔离。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com