

喉乳头状瘤_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_96_89_E4_B9_B3_E5_A4_B4_E7_c22_609319.htm 喉乳头状瘤是喉部最常见的良性肿瘤，可发生于任何年龄，10岁以下儿童多见，可能与病毒或内分泌有关。【诊断】一、病史病程慢，声音嘶哑为主要症状，喉部异物感或刺激性咳嗽。幼儿型发展较快，影响到声门、声门下或气管时出现呼吸困难及喘鸣等。二、体格检查成人型以单发为多见，肿物常局限声带粘膜表面，呈暗红色、乳头状；幼儿型多呈基底部较宽的多发肿瘤，呈菜花样，色苍白或暗红，喉部各处皆可发生。【治疗】以手术切除为主，如单发者，在间接、直接喉镜或显微镜下进行手术；复发或多发者，可行气管切开术及喉裂开术切除肿瘤，也可配合激光、冷冻、电灼治疗。亦可用免疫疗法干扰素等治疗。癌变者按喉癌处理。对放射治疗不敏感，现已不采用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com