

喉血管瘤_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_96_89_E8_A1_80_E7_AE_A1_E7_c22_609320.htm

喉血管瘤少见，可发生于任何年龄。有毛细血管瘤和海绵状血管瘤# 种类型。【**诊断**】一、病史生长喉内不同部位及其大小不一，则有不同症状，若生长于声带上首先出现声音嘶哑，如有损伤可致出血。若肿瘤较大，可有呼吸困难及喘鸣。二、体格检查喉镜下所见：声带或声门下区等处、肿瘤突起于粘膜，呈结节状或肉芽状，颜色红或暗红，基广或带蒂，或蔓延喉咽部、颈部皮下。婴幼儿往往于声门下可见暗红色肿物，表面不平，触之较软。临床上注意与假性血管瘤鉴别，如声带上静脉曲张，出血性息肉或非特异性肉芽肿等。活检应属禁忌。【**治疗**】无症状可暂不治疗。肿瘤较小可施行电烙术或激光治疗，对严重咯血者，可施行喉裂开术切除肿瘤，并可用电烙或冷冻减少术中出血。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com