

银屑病性关节炎\_风湿免疫科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E9\\_93\\_B6\\_E5\\_B1\\_91\\_E7\\_97\\_85\\_E6\\_c22\\_609356.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_93_B6_E5_B1_91_E7_97_85_E6_c22_609356.htm) 银屑病性关节

炎(psoriatic arthritis, pa)是一种炎症性关节炎，伴有皮肤或指甲银屑病，其主要特征是累及远端指间关节，类风湿因子通常阴性。一般认为，本病是免疫、遗传及环境因素复杂的相互作用的结果。【诊断】1.病史及年龄 高峰发病年龄约40岁，多数缓慢发病。2.临床表现(1)关节病变关节受损的表现 变异很大。主要以累及指(趾)关节、掌指关节、跖趾关节等手、足小关节为主。也可累及肘、膝等四肢大关节，少数累及骶髂关节或脊柱。常不对称受累。表现为关节肿胀、疼痛和晨僵，有时整个手指呈香肠指(趾)畸形。(2)皮肤及其他表现 指甲或皮肤银屑病可发生在关节炎之前或后。80%的pa病人有指甲异常，出现“顶针”样凹陷样改变。部分病人可出现结膜炎、虹膜炎及角膜等眼部炎症。3.实验室检查 本病无特征性的实验室诊断指标。(1)轻度贫血，血沉增快。(2)类风湿因子阴性。(3)部分患者，特别是累及脊柱时，可表现为hla - b27阳性。4.影像学检查 可见远端指(趾)间关节受累，末节指(趾)骨远端骨质吸收，使之变细、变尖，出现“伞状”或“削铅笔刀”样改变。脊柱同时受累的患者，可见孤立的边缘性或非边缘性的韧带骨赘。【治疗】治疗目的是控制皮肤损害和关节炎1.支持疗法及理疗。2.药物治疗(1)抗疟疾药如氯喹，对减轻以症状有一定的疗效。(2)非甾体类抗炎药物、金制剂等与治疗类风湿关节炎基本相似的药物。(3)口服甲氧补骨脂素和长波紫外线照射，对皮肤损害的疗效显著

，对关节炎也有肯定疗效。(4)难控制病情的患者用叶酸拮抗剂和免疫抑制剂。3.手术治疗对严重关节疼痛、畸形和功能障碍的四肢关节炎症，可依次采用关节清理术（关节镜下或开放）、关节融合术、关节切除术以及人工关节置换术。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)