

髋部滑囊炎\_风湿免疫科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E9\\_AB\\_8B\\_E9\\_83\\_A8\\_E6\\_BB\\_91\\_E5\\_c22\\_609361.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_AB_8B_E9_83_A8_E6_BB_91_E5_c22_609361.htm)

髋部滑囊炎是髋关节周围滑囊积液、肿胀和炎性反应，由创伤和化学刺激等引起。临床上常见于：  
髂耻滑囊。位于髂腰肌与骨盆之间，其后上方为髂耻隆突，下方为髋关节囊。  
大转子滑囊。系多房性滑囊，位于臀大肌腱附丽点与大转子后外侧骨突之间。

坐骨滑囊。附着于坐骨结节，位于臀大肌深面。【诊断】  
1.髂耻滑囊炎股三角外侧疼痛和压痛，屈曲髋关节或伸髋时，疼痛加剧。如滑囊过度肿胀，腹股沟的正常凹陷消失，或甚至隆起，有波动感，疼痛加重。股神经受刺激或压迫时，疼痛沿大腿前部放射至小腿上部内侧。须与髋关节病变和腰骶部结核等鉴别。  
2.大转子滑囊炎大转子上方疼痛，不能向患侧卧，大转子后方压痛，髋关节内旋使臀大肌紧张压迫滑囊时，疼痛加剧。  
3.坐骨滑囊炎老年人多见。局部疼痛使患者不能取正常坐位，臀肌收缩时疼痛并放射至臀部。【治疗措施】滑囊炎急性期应适当休息减轻压迫，局部理疗，穿刺抽液注入醋酸氢化可的松等药物。慢性期经久不愈影响功能者，可行滑囊摘除术。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)