

过期妊娠_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_BF_87_E6_9C_9F_E5_A6_8A_E5_c22_609379.htm

平时月经规则，28~30天来潮一次。妊娠达到或超过42周，称为过期妊娠。【诊断】1. 核实末次月经、详细询问月经史，早孕反应和胎动开始日期，早期产前检查，子宫大小与妊娠月份是否相符，羊水多少及宫颈成熟度。（见p496附表：宫颈评分）2.b超测定胎头双顶径、股骨长度、羊水深度、胎盘分级及胎儿生物物理相评分。manning评分根据nst正常b超胎儿呼吸lt.7分，给硫酸普拉酮钠200mg静滴，每日一次，共3天以促进宫颈成熟。或用普比迪凝胶.0.5mg推注宫颈管一次。2.宫颈管已容受nt或oct试验评分7分，可以静脉点滴催产素，需专人观察血压、胎心、宫缩情况。6分者征求家属意见决定分娩方式。3.米索引产:一次0.025~0.05mg即1/4片塞后穹窿。无效时12h后再塞0.05mg观察同催产索引产。（三）剖宫产：确定为过期并出现下列情况之一、二者：1.有胎儿宫内窘迫征象（如引产后胎心异常，羊水重混浊）、高龄初孕、妊高征、臀位、双胎应考虑手术。2.估计胎儿巨大，跨耻征阳性，虽各项检查指标正常，可考虑手术。3.血e3、hpl值异常，连续测定有下降或出现低值，较原水平下降50%，考虑引产或手术。4.宫颈未容受，引产3次失败者。5.b超示羊水深度四象限平均值lt.2cm，破膜时羊水量少，oct、nt评分5分并出现晚减者。（四）临产后，给o2连续胎心监护等。严密观察产程进展，及时发现异常情况及早处理。（五）做好新生儿复苏抢救准备，通知新生儿医师到

场。羊水 °混浊之新生儿出生后常规行气管内插管，吸除气管内分泌物。过期产儿要加强观察、护理。（六）作好产后出血预防工作。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com