

羊水过少_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_BE_8A_

[E6_B0_B4_E8_BF_87_E5_c22_609381.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_BE_8A_E6_B0_B4_E8_BF_87_E5_c22_609381.htm) 足月妊娠羊水量少于300ml者，称为羊水过少。羊水过少对胎儿危害性1.孕早期发生羊水过少，羊膜与胎体粘连可造成严重畸形甚至肢体短缺。2.孕中、晚期羊水过少，由于胎儿受周围压力影响，常呈特殊状态，皮肤皱如皮革状。3.由于胎儿胸部受压使肺部发育受抑制。4.易发生早产及胎儿窘迫，新生儿窒息率及围产儿死亡率增高。【诊断】1.孕妇自觉胎动时腹痛。2.产前检查发现宫高与腹围比同期妊娠者小。小于妊娠曲线第10百分位以下者。3.子宫敏感，易宫缩，宫内有充实感而无胎块漂浮或浮动感。4.常于人工破膜时，发现无羊水或仅有少许粘稠液体。5.凡过期妊娠，胎儿宫内发育迟缓，妊高征，妊娠并发慢性高血压，慢性肾炎，均应考虑有羊水过少的可能性。6.b超检查，发现羊水明显减少，羊水暗区 2cm。【治疗】1.妊35周前羊膜腔内输入37℃,0.85%盐水15—20 ml/分。羊水过少是胎儿危险的重要信号。2.妊35周后，合并妊高征，iugr,慢性高血压，慢性肾炎，同时羊水过少，经对症治疗未见好转者，应终止妊娠。3.妊37周后，确诊为羊水过少，应终止妊娠。4.终止妊娠前应行胎儿=胎盘功能检查，产程中密切观察胎儿情况。出现胎儿窘迫，应立即结束分娩。估计短时间内不能结束分娩的，在排除胎儿畸形后，可选用剖宫产术。5.产时及术前应做好新生儿复苏抢救准备。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com