

死胎\_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E6\\_AD\\_BB\\_E8\\_83\\_8E\\_\\_E5\\_A6\\_87\\_c22\\_609382.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_AD_BB_E8_83_8E__E5_A6_87_c22_609382.htm) 妊娠20周后，胎儿在宫内死亡，称为死胎。如胎儿在分娩过程中死亡，称为死产。胎死4周以上未娩出者，易继发凝血功能障碍，诱发dic。

【诊断】1.临床表现：孕妇自觉胎动停止，胎死过久而未娩出，孕妇可出现全身乏力、纳呆、恶心等不适及体重下降，乳房缩小等。2.腹部检查：子宫不继续增大甚至缩小，无胎动，听不到胎心。3. b超或多普勒检查见胎心及胎动消失为确诊依据。如胎儿死亡过久，b超见胎头塌陷、颅骨重叠、胎头变形。4. 实验室检查：24h尿e3 < 3mg，提示胎儿死亡。如合并dic可出现三p试验阳性，血小板进行性下降，凝血时间、凝血酶原时间、凝血酶时间延长等。

【治疗】1. 确诊死胎，应即收入住院，查血常规、出凝血时间、血小板，死胎超过四周未娩出者应做三p试验、凝血酶原时间、纤维蛋白原等检查，临产后备新鲜血，注意预防产后出血、dic和感染。2. 常规口服vitc, vitk三天以上，必要时口服求偶素5 mg, tid × 5?。3. 检白带常规，阴道擦洗3天。4. 口服抗生素预防感染。5. 未临产者结合具体病例，给予不同引产方法：（1）羊膜腔或宫腔注射利凡诺100mg。（2）水囊引产。（3）米索引产。（4）服蓖麻油炒蛋。（5）催产素静脉点滴。6. 如有dic应作相应治疗。7. 产后仔细检查胎盘、胎膜、脐带、胎儿等以明确死亡原因。近期死亡儿应争取尸解，胎盘、胎膜、脐带常规送病检。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)