

额先露_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_A2_9D_E5_85_88_E9_9C_B2__c22_609412.htm 额先露 (brow

presentaion) 是指胎头的姿式处于俯屈与仰伸之间 (介于枕先露与面先露之间) 的位置 , 胎头的大囟到眼眶的部分处于骨盆入口处。额先露是一种暂时性的胎位 , 因胎头可俯屈而变为枕先露 , 或胎头进一步仰伸而成为面先露。cruikshank等观察到有2 / 3的额先露后来转为枕先露或面先露。持续呈额先露者颇为少见 , 约占头先露的0.5 ~ 1‰ , 经产妇多于初产妇。额先露时 , 胎头将以其最大头径 (枕颞径) 通过骨盆 , 故足月正常的胎儿不可能经阴道自然娩出。【病因】额先露的发病原因与面露的发病原因基本相同 , 凡能影响胎头正常屈伸的因素均可致额先露。meltzer观察到额先露中有21%有早产、骨盆狭窄或腹壁松弛等因素存在。【诊断】凡宫缩良好而胎头迟迟不能入盆时 , 即应想到有此种胎位的可能 , 而进行以下检查 : 一、腹部检查 额先露时作腹部触诊容易扪及枕部或颞部。额前位时 , 于下腹部耻骨联合上方可触及胎儿枕骨隆突及其与胎背间之凹沟 , 但不如面先露时明显。单凭腹部检查很难确诊为额先露。二、阴道检查 可扪及额骨及额缝 , 额缝一端为大囟门的前半部 , 另一端为眼眶及鼻根部 , 这些发现是诊断额先露的可靠依据。【治疗】持续额先露自然分娩机会较少 , 一经诊断一般应行剖宫产术 , 否则可使母儿遭受严重的后果。100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com