

急性外阴溃疡\_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_A5\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_A4\\_96\\_E9\\_c22\\_609428.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E5_A4_96_E9_c22_609428.htm) 急性外阴溃疡为非接触性传染性的良性溃疡。可能是革兰阳性粗大杆菌引起。【诊断】1. 起病急，可有发热、全身无力等不适。外阴瘙痒或灼疼。溃疡可发生于外阴各部，以小阴唇和大阴唇内侧多见，其次为前庭黏膜及阴道口周围。2. 其病损可分为粟粒型、下疳型、坏疽型及混合型。【治疗】1.全身治疗:注意休息及营养，补充大量维生素b, c.也可口服中药治疗。有继发感染时应考虑应用抗生素。2.局部治疗:应用1:1000利凡诺尔溶液或1:1000呋喃西林溶液湿敷后涂女阴溃疡膏、养阴生肌散、10%苯佐卡因软膏或樟丹蛤粉油调外用。也可考虑激光局部照射。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)