

白塞氏病_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_99_BD_E5_A1_9E_E6_B0_8F_E7_c22_609429.htm 本病以虹膜睫状体炎、

口腔及生殖器溃疡为主要特征。也叫眼、口、生殖器综合征。【诊断】1. 反复发作的三种特征性表现：口腔溃疡、外阴溃疡、眼部虹膜睫状体炎及前房积脓。以上三大症状中如具备两项，即有诊断意义。

2. 本病可能是自身免疫性疾病，也有人认为与病毒感染有关。发病时可伴全身发热，肝脾肿大，皮肤、关节、血管系、消化系、肺、肾、中枢神经系统等多器官系统的损害。损害的基本病变呈血管炎。

3. 口腔溃疡反复发作。眼部除虹膜睫状体炎和前房积脓外，还可能有结膜炎、角膜炎、视网膜出血、视神经萎缩，继发性青光眼、继发性白内障等。

外阴溃疡可发生于大小阴唇、阴蒂、尿道口、甚至阴道宫颈等处，为单个或多个大小不等的圆形或卵圆形溃疡，重者边缘不整、基底不平，表面覆盖灰黄色分泌物，在感染时分泌物为黄绿色并伴局部淋巴结炎。

【治疗】

一、全身治疗 1. 有发热及全身症状时，注意休息和营养，补充维生素b,c。避免刺激性食物。 2. 病情急重者可应用皮质类固醇激素，常用量为：强的松5~10 mg，每日3次或地塞米松1.5mg，每日3次。强的松可加量至40~60mg/d，病情控制后即速减量。

3. 免疫抑制剂，常用环磷酰胺、秋水仙碱、6-巯基嘌呤、瘤可宁等。 4. 支持疗法：小量输血、丙种球蛋白、转移因子、中药等。 5. 非皮质类固醇抗炎剂：消炎痛、阿斯匹林、保泰松等。

二、局部治疗 1. 口腔溃疡可涂擦冰硼散、锡类散、生肌散、青黛散、珠黄散。或涂擦2%甲紫，2.5%金霉素甘

油等。 2.外阴溃疡，可用1:5 000高锰酸钾坐浴或1:1 000利凡诺尔液湿敷后外涂女阴溃疡膏、黄连青黛散(黄连或黄柏、青黛各15g,元明粉1.5g,冰片0.6g,共研细末)，每日2~3次。或用金霉素眼膏，10%苯佐卡因软膏，可的松软膏等。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com