

外阴损伤_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_A4_96_E9_98_B4_E6_8D_9F_E4_c22_609430.htm 外阴损伤主要指外阴

及阴道的损伤。最多见于分娩时的损伤，其次为粗暴性交、
外伤、烧伤、烫伤、化学腐蚀剂等。【诊断】1. 初次性交时

，如性交粗暴可造成外阴、阴道裂伤；如产后或年老妇女，
因卵巢功能低下、阴道黏膜菲薄、组织弹性较差，如性交粗
暴也可造成外阴、阴道裂伤。患者除疼痛外可引起活动性出
血。2. 外伤也可引起外阴、阴道损伤。均因跌伤或撞伤，外
阴部突然触及有棱角的硬物上。受伤后患者立即感到外阴疼
痛。伴外阴出血。检查时可见外阴部的创伤及活动性出血

。3. 分娩时的会阴及阴道裂伤可分为三度： 度裂伤：阴唇
、后联合部位的会阴皮肤、阴道黏膜撕裂，未达肌层。 度
裂伤：会阴皮肤撕裂已达会阴体肌肉，但未损伤肛门括约肌
。此类损伤多累及阴道后壁黏膜。 度裂伤：除会阴皮肤、

肌层断裂外，肛门括约肌部分或完全断裂，甚至累及直肠前
壁，多伴有较深的阴道及盆底组织撕裂。4. 陈旧性会阴 度
裂伤陈旧性会阴 度裂伤系分娩时会阴 度裂伤未及时发现
或修补失败的结果。因肛门括约肌断裂，病人有大便失禁及
不能控制排气。如肛门括约肌未全断裂，则对成形大便可有
一定控制能力。检查时可见会阴体消失，两侧小阴唇后方分
离，后联合及舟状窝已不存在。在肛门括约肌断裂的顶端有
时可见直肠黏膜外翻呈鲜红色。将手指伸入肛门内，让病人
做收缩肛门的动作，手指可感到周围无紧缩感。【治疗】1.

由于初次性交引起的处女膜裂伤，大多程度较轻或仅有少量

出血，可以自愈，不需治疗。因性交或外伤引起外阴及阴道明显损伤时，均应立即缝合止血。2. 分娩引起的会阴、阴道裂伤与处理分娩的技术是否熟练和正确有一定关系。分娩结束后应仔细检查，如有裂伤，应按原来的解剖关系逐层修补缝合。3. 如能正确处理产程，二度裂伤是可以避免的。一旦发生应及时修补，争取早期愈合，如未能及时修补或修补失败，可在产后6个月修补，也有的患者若干年后才修补。术前准备和术后护理是极其重要的。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com