

外阴血肿\_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_96\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_A4_96_)

[E9\\_98\\_B4\\_E8\\_A1\\_80\\_E8\\_c22\\_609431.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_A4_96_E9_98_B4_E8_A1_80_E8_c22_609431.htm) 外阴血管丰富，组织疏松，若上皮未破，而皮下血管破裂，则血液在疏松组织中迅速蔓延，即可在外阴，甚至阴道内形成血肿。血是细菌极好的培养基，如处理不及时，还可引起继发感染。【诊断

】1. 外阴血肿大多发生在外伤、分娩及初次性交时。一般外伤均因不慎跌伤或撞伤，外阴部突然触于有棱角的硬物上，如该物较尖则可伤及阴道、膀胱、直肠，甚至腹腔内。2. 患者除扪及外阴部有块状物外，还伴有剧烈疼痛及行动不便。巨大血肿压迫尿道时，可有尿潴留。3. 检查外阴或阴道，可见蓝紫色块状隆起，压痛明显。【治疗】1. 如血肿不大，直径4~5cm，出血已停止，可给予局部冷敷，密切观察。如不继续长大，24小时后给予热敷，促进血肿吸收，也可辅加超短波、红外线等物理治疗。2. 如血肿较大或血肿继续增大，则应手术切开，取出血块，寻找出血点，结扎止血。如未发现活动出血，在清除积血后，可用肠线缝合，封闭血肿腔，并放引流条。如血肿陈旧或已经感染化脓，应切开引流，引流条一般在术后24小时取出。3. 外阴血肿，不论切开与否，均可在血止后配合中药治疗，如内服七厘散或七厘散调敷患处。也可用热敷、坐浴、理疗等方法帮助血肿吸收。若已感染，外敷药中可加用金银花、蒲公英等清热解毒药。必要时应用抗生素。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)