

阿米巴性阴道炎_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_98_BF_E7_B1_B3_E5_B7_B4_E6_c22_609446.htm 阿米巴性阴道炎是由溶组织阿米巴原虫引起的一种少见的阴道炎，大多继发于肠道阿米巴病，阿米巴侵入阴道后刺激并破坏黏膜，从破损的黏膜进入黏膜下结缔组织，使黏膜渗出大量液体，并形成溃疡及坏死，宫颈亦常被侵犯，但由于自然防御机制的保护，常不上行感染宫腔。【诊断】（一）症状和体征1. 大多数患者有腹泻或痢疾病史。2. 阴道分泌物呈浆液血性或脓性，伴有阴道疼痛。3. 妇科检查见阴道或宫颈有典型的溃疡，其边缘凸出、底部发黄、易出血，多见于阴道皱褶沟纹内，常多个溃疡融合成大片坏死。（二）辅助检查1. 直接涂片检查，阴道分泌物或溃疡刮出物，可见溶组织阿米巴的滋养体。2. 活组织检查，溃疡组织内见有阿米巴及典型的炎症反应时可以确诊，并排除恶性病变、结核或梅毒。【鉴别诊断】本病需与外阴阴道念珠菌病、滴虫性外阴阴道炎、老年性外阴阴道炎、下生殖道淋病奈瑟菌感染、下生殖道沙眼衣原体感染、恶性病变、结核及梅毒等相鉴别。【治疗】1. 预防为主，及早彻底治疗肠道阿米巴感染。2. 甲硝唑200mg，口服，每日3次，7天为一疗程.或每晚置阴道内甲硝唑1片(200mg),10天为一疗程。3. 卡巴肿(carbarsone) 0.3~0.6g，每日，分2~3次口服，共10日。停药10日后可再进行第二个疗程。卡巴肿可有恶心、呕吐、腹泻等反应。严重不良反应有皮疹，偶有剥脱性皮炎、粒细胞减少、肝损害等。故肝功能不良与对肿剂敏感者禁用。孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com