

外阴湿疹样癌\_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_96\\_E9\\_98\\_B4\\_E6\\_B9\\_BF\\_E7\\_c22\\_609476.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_A4_96_E9_98_B4_E6_B9_BF_E7_c22_609476.htm) 外阴湿疹样癌又称派杰病(paget dis-ease)。 【诊断】 1.多发生于绝经前后及老年，少数为30~40岁妇女。 2.慢性外阴瘙痒，病程长。 3.多发生于大阴唇及肛周，成片皮肤湿疹样病变、红肿或白色，边界清，病变范围大小不等，可伴局部渗出、溃疡及结痂。 4.活组织病理诊断，主要病变为派杰细胞，限于上皮层内，属原位癌。诊断时应做连续切片以排除其合并皮肤附件腺癌(约有20%)，因其治疗方案不同。 【治疗】行单纯浅层皮肤外阴切除术。切缘距病变5mm以上。如合并腺癌应行广泛外阴切除及双侧腹股沟淋巴清除术，手术范围根据分期，参考外阴鳞状细胞癌手术治疗。必要时加放疗或化疗。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)