

阴道上皮内瘤样病变_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_98_B4_E9_81_93_E4_B8_8A_E7_c22_609481.htm 阴道上皮内瘤变本病变包括阴道上皮不典型增生和原位癌。【诊断】1.常无明显临床表现，偶有性交后血性白带或极少量出血。阴道检查时，肉眼看不见明显病变。2.阴道涂片可发现异常细胞。3.阴道镜检查可见白色上皮伴有点状血管、镶嵌样血管网等结构。4.在碘试验指示下取活检明确诊断。【治疗】1.可用激光、冷冻或电凝行局部治疗。2.可用5%5-氟尿嘧啶霜局部涂抹，每日1次，5次为一疗程，观察6~12周。3.手术:根据病变范围决定手术范围，肿瘤小可行局部切除或部分阴道切除，病变广泛则行全阴道切除或全子宫及阴道切除术。年轻患者，应同时行阴道重建术。4.老年体弱，不能耐受手术或子宫已切除，阴道穹窿部位病变程度难以确切估计经保守治疗无效者可行阴道放射治疗（后装治疗）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com