

输卵管肿瘤_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_BE_93_E5_8D_B5_E7_AE_A1_E8_c22_609490.htm

输卵管肿瘤少见，良性瘤如输卵管腺样瘤、乳头状瘤、平滑肌瘤、血管瘤等，不予详述。原发性输卵管癌亦少见，约占生殖道恶性肿瘤0.5%。【诊断】原发性输卵管癌 1.阴道排液，水样、黄色或血性。 2.不规则阴道出血或绝经后出血。 3.下腹疼痛，多为患侧痛。 4.晚期可伴有腹水或扣到腹部包块。 5.可有原发或继发不育史。 6.盆腔检查，在子宫的一侧触及肿块或伴有压痛。 7.辅助检查包块b超、阴道细胞学检查、分别取宫颈及宫腔内膜病理检查，当阴道细胞学阳性而颈管及子宫内膜病理无癌或有不能解释的异常阻道出血时，应想到输卵管的可能性。有条件可行腹腔镜检查，能发现盆腔检查不能发现的仅有管径增粗的输卵管病变。 8.分期：同卵巢癌。【治疗】手术辅以化疗或（和）放疗综合治疗。治疗原则同卵巢癌。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com