

风疹_感染科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_A3_8E_E7_96_B9__E6_84_9F_c22_609551.htm

风疹是由风疹病毒引起的一种急性传染病，主要经飞沫传播，也可经口、眼及鼻腔分泌物直接接触传染。临床上主要表现为针头至米粒大粉红色斑疹及斑丘疹，常伴有发热及淋巴结肿大。【诊断】一、病史（一）多发于春季；（二）好发于1~5岁的儿童，常在托儿所或幼儿园造成流行。（三）潜伏期长短不一，约9~21天。通常在接触感染后二周发病。（四）前驱期较短，约0.5~3天，发疹前常有发热、咳嗽、结膜红肿、呕吐及腹泻等前驱症状。（五）皮疹多在发病的第4~5天后消退，不留痕迹或有小片状脱屑。二、体征（一）发热：多见于成人，通常在发疹前1天就出现，一般体温38℃，少数可达39℃以上。持续时间长短不一，有的可持续5~6天。（二）皮疹：通常在发热的第1~2天出现。首先见于面部，表现为稀疏的粉红色斑疹及斑丘疹，以后皮疹迅速向颈部、躯干及四肢扩展，24小时内皮疹泛发全身。面颈及四肢的皮疹可相互融合，3~5天内皮疹会完全消退，消退后不留痕迹，或有较浅的色素沉着及细小的脱屑；（三）淋巴结肿大：在发热的同时，全身浅表淋巴结均可肿大，枕后、耳后、颈部、腋窝及肘部淋巴结肿大尤为明显，可有轻度压痛，（四）并发症：15%~20%早期妊娠的孕妇可发生风疹综合征，引起流产、死产、早产及胎儿畸形；少数患者可发生关节炎、支气管炎、中耳炎及脑炎。三、实验室检查（一）血常规：白细胞总数下降，淋巴细胞先降后升，可见浆细胞；（二）血清学检查：能测出高效价血凝抑制抗体；若

出生时有高效价风疹igm抗体，可诊断为先天性风疹。四、鉴别诊断需与麻疹、传染性红斑、幼儿急疹及猩红热等鉴别。

【治疗】一、治疗原则（一）注意隔离；（二）对症治疗；（三）防止并发症的发生。二、治疗方法（一）一般疗法：发热期应卧床休息，给予流质及半流质等易消化的食物；（二）对症治疗：病情重者应予对症治疗；（三）中药疗法：银花12.0、连翘10.0、蝉退9.0、赤芍6.0、板蓝根15.0、甘草6.0，每日一剂两煎，连服2~3天。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com