

沙眼衣原体感染_感染科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_B2_99_E7_9C_BC_E8_A1_A3_E5_c22_609574.htm

非淋菌性尿道炎即检查不到淋菌的尿道炎，是由沙眼衣原体及分解尿素支原体引起的性传播疾病，该病在世界范围内均发病率高，居性病传播疾病的首位。病人及隐性感染者为传染源，通过性接触传染。好发于性活动旺盛的青年，女性比男性易感。病原体在局部尿道定居，引起炎症反应，故临床主要表现为尿道有少量分泌物，排尿灼痛感。属中医“淋证”范畴。【诊断】1. 流行病学特征 有不洁性交史，潜伏期10~20日。2. 症状与体征（1）尿道炎症状：尿道口刺痒，尿频，尿急，尿痛。（2）尿道中有分泌物溢出，常为稀薄透明粘液。3. 常见并发症 反复发作者可并发附睾炎、前列腺炎、女性阴道炎、输卵管炎及盆腔炎。4. 实验室及其他检查（1）尿道分泌物涂片中性粒细胞多，常多于5个以上。（2）淋菌镜检和培养检查阴性。【鉴别诊断】1. 淋病 淋病的潜伏期较短，仅2~3日，尿道炎症状明显，尿道溢脓，分泌物涂片可查到淋菌。2. 非特异性尿道炎 由化脓性细菌如葡萄球菌、大肠杆菌等引起的尿道炎，多为继发性感染，且与性接触无关。【治疗】1. 西医治疗（1）全身抗感染治疗：可选用如下药物。 四环素为首选：剂量每次0.5g，每日4次，口服，7~10日为1个疗程，一般2~3个疗程见效。 红霉素：每次0.5g，每日4次，口服，7~10日为1个疗程，用药2~3个疗程。 强力霉素：每次0.1g，每日2次，口服，10日为1个疗程。 复方新诺明：每次2片，每日3次，口服，10日为1个疗程。 有本药过敏史

者慎用。 严重感染：用红霉素1.2g加入葡萄糖液1000ml静脉滴注。或庆大霉素24万u加入葡萄糖液1000ml静滴，每日1次，用药10日，后改口服药。（2）局部治疗：以杀菌，清洁局部为原则。 1/10000高锰酸钾溶液外洗局部。 局部红肿者，外涂四环素软膏或红霉素软膏。2. 中医治疗（1）局部清洁洗浴：可用洁尔阴，以温开水配成10%的浓度，坐盆洗浴，每日2次。（2）杀菌消炎：可用尿感宁，每次1包，每日3次，口服。或三金片，每次4片，每日3次，口服。均2周为1个疗程。（3）汤药：按“淋证”辨证施治。 湿热蕴结：症见小便短赤涩痛，大便秘结，苔黄腻，脉濡数。治宜清热利湿通淋，方用八正散加减：蓄15g，瞿麦10g，木通6g，车前子（包）10g，滑石15g，大黄10g，栀子10g，甘草10g。水煎服，日1剂。 正虚邪恋：症见小便短涩，时作时止，遇劳即发，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡苔黄。治宜补虚清湿热，方用知柏地黄汤加减：知母10g，黄柏10g，生地15g，淮山15g，丹皮10g，泽泻10g，茯苓15g，牛膝15g，车前草15g。水煎服，日1剂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com