

疥疮_感染科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_96_A5_E7_96_AE__E6_84_9F_c22_609661.htm 疥疮是由疥螨引起的接触传染性皮肤病；主要皮疹为散在小丘疹、丘疱疹、小水疱及隧道，接触传染性强，常造成家庭及集体传染。【诊断】一、病史（一）家庭成员或亲密接触者常有类似病史；（二）瘙痒明显，以夜间为剧。二、体征（一）好发于指间、指侧、腕部屈侧，肘窝、腋窝、脐周、下腹部、外生殖器、腹股沟、股内侧等处；婴幼儿发病可累及头面部及掌跖部位；（二）常见皮损为小丘疹、丘疱疹及小水疱，孤立存在，散在分布，皮疹一般不红；（三）特征性损害是在皱折处新旧两个皮疹之间可见数毫米长的隧道，隧道盲端有一灰白色小点，为疥螨所在处；（四）病程久者可见抓痕、结痂、湿疹样变及脓疱；（五）婴幼儿腹部及青少年外生殖器部位常可见到结节性损害。三、实验室检查采用针挑法或刮片法可检出疥螨或疥螨残体及疥虫卵。【治疗】一、治疗原则（一）采用外用药治疗，正确掌握涂药方法；（二）及时诊断，尽早治疗；（三）家中成员有类似症状应同时治疗；（四）治疗结束时应烫洗内衣内裤及床单被单。二、治疗方法（一）1% - 六氯苯霜20~30克，自颈部向下全身涂布，12~24小时后洗去。2岁以下儿童、孕妇及哺乳期妇女禁用。（二）硫磺霜：全身涂布。10岁以上患者用20%制剂，3~10岁用10%制剂。3岁以下用5%制剂。每晚一次，连用3天，最后一次用药后24小时洗去。（三）5%三氯苯醚菊酯霜30克，自颈部向下全身涂布，8~14小时后洗去。 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com