

强直性脊柱炎_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_BC_BA_E7_9B_B4_E6_80_A7_E8_c22_609673.htm

【诊断】1.症状(1)男性为主，发病年龄多在10~20岁之间。(2)起病隐匿，病程长。(3)腰痛为主要症状，渐向胸椎、颈椎发展。(4)脊柱外病变多见于近躯干的髋、膝等大关节，并呈对称性发病。跟腱附力点炎。(5)晨僵。(6)全身症状，虹膜睫状体炎，心脏病变，炎性肠病。2.体征(1)腰僵，活动受限。(2)髋、膝关节活动受限，畸形，晚期骨性强直。3.影像学改变(1)双髋髌关节炎，骨质疏松。(2)腰椎小关节融合，韧带钙化，骨桥形成“竹节样”改变。(3)髋、膝关节受累表现为软组织肿胀，关节间隙狭窄，晚期骨性强直。4.化验检查(1)急性期血沉加快，crp升高。静止期血沉正常。(2)hla-b27阳性率约为90%以上。(3)类风湿因子阴性**【治疗】**1.功能锻炼，维持正常身体姿势，理疗。2.药物治疗(1)非甾体类抗炎药。(2)病情改善药柳氮磺吡啶，甲氨蝶呤。慎用激素类药物。(3)中药制剂。3.手术治疗病变晚期：严重脊柱畸形可行截骨术；髋、膝畸形可行人工关节置换术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com