

髌前滑囊炎_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_AB_8C_](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_AB_8C_E5_89_8D_E6_BB_91_E5_c22_609701.htm)

[E5_89_8D_E6_BB_91_E5_c22_609701.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_AB_8C_E5_89_8D_E6_BB_91_E5_c22_609701.htm) 滑囊炎（一）概述

定义：常为慢性过程，主要表现为滑囊积液和疼痛； 病因

：感染性滑囊炎、外伤性滑囊炎、化学性滑囊炎及其他原因

引起。【诊断】1.有逐渐出现的肿块和疼痛。2.肿块多较硬，

界限清楚，无痛，但可有压痛。3.必要时可穿刺，x线片有助于

诊断和鉴别诊断。【治疗】1.化脓性滑囊炎同外科化脓性

感染的治疗，若有脓则切开引流，炎症控制后可切除。2.外

伤性滑囊炎 穿刺抽液加压包扎。 休息、理疗、消炎止痛。

抽液后注入激素类药物。 手术切除。 病因治疗。（二）髌

前滑囊炎 髌前滑囊分为髌前皮下囊、髌前筋膜下囊和髌前腱

下囊。因外伤或反复摩擦可致急性或慢性滑囊炎。多为髌骨

局限性肿胀、轻痛，关节活动正常。可抽液加压包扎或手术

切除。（三）窝囊肿 系指窝内的滑囊炎，可出现在肌腱之间、

肌腱与关节囊之间、肌腱与韧带之间，多与关节相通。其

主要表现为窝部肿块，为圆形或椭圆形，大小各异，有张力

，无压痛或轻压痛。勿把局部脂肪沉积误认为肿块。可手术

切除。（四）跟腱滑囊炎 其滑囊包括跟骨后滑囊和跟腱后滑

囊。此处滑囊炎可致跟腱局限性隆起、疼痛、肿胀，走路时

加重。可保守治疗，热敷、药物或摘除滑囊。（五）肩峰下

滑囊炎 肩峰下滑囊又称为三角肌下滑囊。肩峰下滑囊炎主要

症状为疼痛运动受限及局部压痛。疼痛为逐渐加剧性，运动

时加重，尤以外展、外旋时明显。压痛多在肩关节、肩峰下

、大结节处。保守治疗包括：休息、抗炎止痛药物、理疗、

局部封闭及适当运动，或手术治疗。100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com