

肩和髋弹响症_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_82_A9_E5_92_8C_E9_AB_8B_E5_c22_609702.htm

(一) 弹响肩 它不是一个疾病而是一种症状。1. 病因 (1) 在肩关节运动过程中出现暂时半脱位，继续运动时又自行复位而出现弹响，成为习惯。(2) 关节内或周围出现异常软组织索条，在骨突上滑动出现的弹响。弹响反复出现，可致疼痛。2. 治疗休息、理疗、局部封闭。有手术适应证者可手术治疗。(二) 弹响肩胛 为多种原因引起的共同症状，如骨质结构的变化、肌肉的病变、肩胛下滑囊炎等。治疗 保守治疗(理疗、局部封闭)，若有骨质改变可手术切除。(三) 弹响髋：1. 关节内弹响较少见，可发生于儿童或成人。2. 关节外弹响较常见。(1) 病因发生于髂胫束后缘增厚，臀大肌前缘增厚。在髋关节屈曲、内收、内旋活动时与大粗隆滑动而致弹响。(2) 治疗 保守治疗； 手术治疗：切断或切除引起弹响的增厚的软组织，术后要早期锻炼功能。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com