

锁骨骨折_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_94_81_E9_AA_A8_E9_AA_A8_E6_c22_609742.htm

锁骨骨折是常见骨折，约占全身骨折的5%。多见于青壮年与儿童，偶见于新生儿产伤。【诊断】有外伤史，局部疼痛明显，肩部活动受限。查体局部肿胀，压痛。骨折有移位时可触及骨折端及骨擦感。拍摄锁骨正位x线片可以明确诊断。【治疗】1.中1/3骨折(1)儿童骨折或无移位骨折，用“8”字绷带固定3~4周后开始功能练习。(2)有移位时，用“8”字绷带或锁骨带固定4~6周。3.中1/3骨折手术指征 有血管神经损伤需进行探查手术。

开放骨折。多发骨折，尤其同一肢体多发骨折时可适当选择手术。骨折不愈合。年轻女性为美容考虑，可适当选择手术。手术方法为髓内针固定或钢板螺钉固定。2.外侧1/3骨折(1)无移位或移位很小者，可用颈腕吊带保护3~4周。(2)锁骨远端骨折移位明显时，复位制动困难，可选择手术治疗。(3)锁骨远端关节内骨折，早期诊断困难。若晚期出现肩锁关节退行性病变，关节疼痛，可以进行肩锁关节融合术或切除2cm远端锁骨。3.内侧1/3骨折内侧骨折合并严重的血管神经损伤时需手术处理，否则用吊带制动4周即可。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com