

胫骨腓骨骨折\_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E8\\_83\\_AB\\_E9\\_AA\\_A8\\_E9\\_AB\\_81\\_E9\\_c22\\_609748.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_83_AB_E9_AA_A8_E9_AB_81_E9_c22_609748.htm) 【诊断】1.结合外伤史、压痛部位和x线检查基本可以诊断。2.但对111型骨折通常须ct检查以免漏诊。3. ct对术前手术计划有重要的指导意义。4.除骨折的诊断外，应对软组织损伤给予重视，如动脉、腓总神经、交叉韧带、半月板等结构。同时要排除合并骨 - 筋膜室间隔区综合征。【治疗】1 . 胫骨腓骨骨折是关节内骨折，对有移位、新鲜的骨折需手术解剖复位内固定，术后早期功能锻炼。采用的手术方法，可根据医师的经验、所具备的器械和骨折的分型采用不同的方法。例如，关节镜下内固定手术；单纯钢板内固定；有限内固定加外固定等。2 . 部分病人存在关节面塌陷的情况则须自体骨、异体骨或人工骨移植。3 . 对陈旧（超过3周）骨折的手术治疗极为困难，往往遗留后遗症。例如，皮肤坏死、神经血管损伤、内固定失败、复位不良、膝关节功能障碍等。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)