

动脉瘤样骨囊肿\_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8A\\_A8\\_E8\\_84\\_89\\_E7\\_98\\_A4\\_E6\\_c22\\_609774.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_8A_A8_E8_84_89_E7_98_A4_E6_c22_609774.htm) 动脉瘤样骨囊肿是一种

一种膨胀性的，由骨内反应性出血组织形成的假性肿瘤。【诊断】1．流行病学（1）年龄10～20岁。（2）性别女多于男。（3）部位好发部位为长骨干骺端和脊柱。2．自然病程

（1）动脉瘤样骨囊肿可以生长很慢，数年没有变化。也可以生长很快，呈膨胀性生长，具有侵袭性。一些静止期病变经数月或数年后逐渐成熟，骨化，而自愈。这种自愈现象不会在侵袭性病变或继发性动脉瘤样骨囊肿发生。动脉瘤样骨囊肿尚无恶变的病例。（2）动脉瘤样骨囊肿常常继发于骨巨细胞瘤，软骨母细胞瘤，骨母细胞瘤，嗜酸肉芽肿，纤维肉瘤，毛细血管扩张性骨肉瘤，纤维异样增生症等。本节只讨论原发动脉瘤样骨囊肿。3．临床表现原发性动脉瘤样骨囊肿多表现为逐渐增大的包块，部分病人伴有不适，包块质硬，固定，无压痛。4．x线表现典型表现为膨胀性密度减低区，皮质极薄，乃至消失。偏心，有时位于骨膜下。病灶内有网格样结构，呈多房样，成熟病变可见骨化。5．其他影像学检查放射性核素扫描、ct、mri。

【治疗】1.手术静止期病变行刮除术后复发率很低。活跃期病变刮除后有20%～30%的复发率，即使行大块的边缘切除，也有5%以上的复发率。侵袭性病变行刮除术的复发率为50%以上，行边缘切除术为15%～20%，而广泛切除后很少复发。2．放疗静止期和活跃期动脉瘤样骨囊肿用1500cgy就可以促其骨化。3.栓塞术当手术和放疗难以实施时，选择性动脉栓塞可以使活跃期或侵袭性动

脉瘤样骨囊肿骨化。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)