

脊索瘤_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_84_8A_E7_B4_A2_E7_98_A4__c22_609787.htm 脊索瘤为发生于残存脊

索的原发恶性肿瘤。【诊断】1.流行病学(1)年龄50~70岁。(2)性别男多于女。(3)部位骸骨和颈椎。2.临床表现主要症状为下腰痛，持续数月或数年，最终导致排尿困难。肛诊于骸前可触及一大的包块。3.自然病程脊索瘤为 b 期肿瘤，表现为无痛性局部缓慢增长，晚期有肺转移。早期行合适的外科切除后预后较好，偶有皮肤转移者。4.x 线表现脊索瘤为位于中线的边缘不清楚的低密度阴影，偶见钙化，但不明显，软组织包块突向前方，突向后方者罕见。5.其他影像学检查放射性核素扫描、ct, mri o【治疗】1.手术广泛的大块切除可以达到良好的局部控制和预防转移，为了保留神经功能而行边缘切除，复发率太高，而囊内刮除没有作用。2.放疗放疗可以暂时控制肿瘤的局部生长，但不能防止转移。术前放疗无效。3.化疗不敏感。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com