

急性扁桃体炎_呼吸内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E6_89_81_E6_c22_609798.htm 急性扁桃体炎为腭扁桃体的急性非特异性炎症，往往伴有程度不同的急性咽炎。

【诊断】一、常发生于劳累和受凉之后、起病急、突然发冷发热、体温一般较高，幼儿可产生抽搐。二、咽痛明显、吞咽时疼痛加重并可放射到耳部。三、急性病容，扁桃体及其周围粘膜充血肿胀、扁桃体上有脓点或脓性渗出。四、下颌角淋巴结常有肿大及压痛。五、多见血白细胞计数增高并有核左移。**【治疗】**一、卧床休息、多喝水、进营养而易消化的食物、必要时用止痛退热药，二、抗炎治疗。（一）青霉素首选，一般用80万u肌肉注射，每日2次，重症者可静脉点滴大剂量青霉素，连续用5~10日。（二）口服复方诺明，每日2次，每次1g。（三）对以上药物过敏者可用红霉素及其他新的广谱高效抗菌素。（四）0.5%灭滴灵100ml静滴，每日2次。三、局部治疗（一）复方硼砂液或淡盐水含漱；以保持咽部清洁。（二）可口含各种中、西药口含片。（三）反复发作而形成慢性扁桃体炎者以及有并发症者应选择适当时机作扁桃体切除术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com