

医院获得性肺炎_呼吸内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_8C_BB_E9_99_A2_E8_8E_B7_E5_c22_609823.htm 医院获得性肺炎亦称

医院内肺炎，是指患者入院时不存在、也不处于感染潜伏期，而于入院4-8小时后在院内发生的肺炎。多见于老年体弱、慢性疾病或重危病人（尤以住ICU者），以及长期应用免疫抑制剂和术后患者。

【诊断】1.临床诊断 入院48小时后出现咳嗽、咳痰，或原有呼吸道疾病症状加重，并出现脓性痰。发热。肺实变体征和(或)湿音。白细胞计数增高或减低，伴或不伴核左移。胸部X线检查示片状、斑片状浸润阴影或实变阴影或间质性改变。排除肺不张、心力衰竭、肺水肿、药物性肺损伤、肺栓塞和急性呼吸窘迫综合征

(ARDS)等疾患。2.病原学诊断 经筛选的痰液(涂片镜检鳞状上皮细胞 ≥ 35 个/低倍视野，或两者比例 $\geq 1:2.5$)连续2次培养分离出相同病原菌，病原菌计数 ≥ 30 次/分。血压 ≤ 8 kPa，动脉血氧分压/吸氧浓度分数(P_{aO_2}/F_{iO_2}) ≤ 300 ，需行机械通气治疗。如入院5天后、机械通气4天后存在高危因素者，即使不全符合重症标准，亦应视为重症肺炎。

【治疗】1.轻、中度肺炎抗菌药物可选用第二、三代头孢菌素， β -内酰胺类加 β -内酰胺酶抑制剂复合制剂，对青霉素过敏者，选用氟喹诺酮类或林克霉素联合大环内酯类药物。2.重症肺炎抗菌药物可选用氟喹诺酮或氨基糖苷类联合下列药物之一： β -内酰胺类如头孢他啶（复达欣）、头孢哌酮（先锋必）、哌拉西林钠等。广谱 β -内酰胺类加 β -内酰胺酶抑制剂复合制剂，如替卡西林加克拉维酸、头孢哌酮钠加舒巴

坦钠等。 碳青霉烯类，如亚胺培南。 耐甲氧西林金葡萄
可用万古霉素。 有真菌感染时选用抗真菌药物，如氟康唑
(大扶康)。 2. 药敏试验 根据药物敏感试验选用有效抗菌药
物最为合适。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。 详细请访问 www.100test.com