

迁延型肺嗜酸粒细胞浸润症_呼吸内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_BF_81_E5_BB_B6_E5_9E_8B_E8_c22_609855.htm 【症状】：迁延性肺

嗜酸粒细胞浸润症:患者中男女比例为1 2，年龄多为20~50岁。半数病人有过敏体质，症状轻重不一，可仅有胸部x线异常，也可重至发生呼吸衰竭。病程约为1~8月。常见症状有咳嗽、发热、气急、体重减轻、盗汗、乏力等，少数病人可有咯血。半数以上病人体检可以出现喘鸣，并可听到细湿罗音。典型的x线表现常有诊断价值，包括三种变化：与肺叶或段无关的渗出阴影，主要分布在两肺外侧，呈进展性；

使用肾上腺皮质激素后渗出灶迅速吸收；随着临床症状的反复渗出亦反复出现。肺功能检查常呈限制性通气功能障碍伴弥散障碍和低氧血症。外周血嗜酸粒细胞比例在10%~40%之间，血沉显著增快可达100mm/h，支气管肺泡灌洗液中嗜酸粒细胞比例可高达40%以上，而正常时小于1%，所有以上变化，均可在治疗后消退。【病理】：迁延性肺嗜酸

粒细胞浸润症又称慢性嗜酸粒细胞性肺炎（chronic eosinophilic pneumonia），由carrington在1969年首次描述，病程和x线表现常较迁延，往往超过1月，症状也较单纯性pie为重。【治疗方法】：不到10%的病人可以自行缓解。肾上腺皮质激素为首选治疗，常用强的松30~40mg/d，用药数小时后即可出现体温下降及一般情况好转，一到两天后气急、喘鸣、咳嗽等症状相继开始好转，x线异常常于用药2天后改善，约在2周内恢复正常，所有临床表现在治疗一月后可完全消失。考虑到此病停药后容易复发，故多主张维持肾上腺皮质

激素治疗至6~12个月，也有病人需用药长达数年。维持治疗一般用强的松10mg/d。如喘鸣明显，可加用茶碱类或 β_2 受体激动剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com