

液气胸\_呼吸内科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B6\\_B2\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_B6_B2_)

[E6\\_B0\\_94\\_E8\\_83\\_B8\\_\\_c22\\_609897.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_B6_B2_E6_B0_94_E8_83_B8__c22_609897.htm) 【症状】：液气胸:[影像学表现] 立位时胸腔下部有液体致密影，液面呈水平状，液平面以上呈气体透亮影，患侧肺受不同程度压缩；液气胸液面的宽、窄、高、低视空气及液体量的多少而异，在病人体位改变时液面始终保持和地面平行。包裹性液气胸多见于胸腔外侧壁，在一包裹性胸积液的阴影上部有透亮的气体影及液平，并不和其他胸膜腔相通。多房性液气胸由胸膜粘连引起，有多数高低不一的液平面，各种体位观察可见液平紧贴于胸壁。【病理】：胸膜腔内同时有积液和积气称为液气胸。支气管胸膜瘘、外伤、手术后及胸腔穿刺术后均可产生液气胸。可分为游离性液气胸及包裹性液气胸两种。【治疗方法】：宜尽早抽完积液或作低位闭式引流，肺复张后出血多能停止。如继续出血不止，除应适当输血外，需给予抗感染治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)