

边缘性龈炎_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_BE_B9_E7_BC_98_E6_80_A7_E9_c22_609999.htm 又称慢性龈缘炎或单纯性龈炎，为龈缘和龈乳头的慢性炎症。【诊断】1. 龈缘和龈乳头变圆钝，表面光滑发亮呈深红色。2. 探诊易出血，龈沟可加深，并可用牙龈指数（gi）、龈沟出血指数（sbi）或（乳头）龈缘）附着龈（pma）指数，表示牙龈炎症程度。3. 局部可有菌斑、牙石、不良修复体或食物嵌塞等刺激因素。可用1-四碘荧光素钠等菌斑显示液来显示牙菌斑，并以菌斑指数（pli）表示菌斑的量，以简化口腔卫生指数（ohi-s），表示软垢和牙石的量。4. 应注意鉴别早期牙周炎及血液病引起的牙龈出血。【治疗】1. 去除局部刺激因素，做龈上洁治，去除菌斑和牙石。2. 某些部位出血较多而血象正常时，用止血粉或明胶海绵止血，并贴敷牙周塞治剂，4~5天后去除。3. 指导患者养成良好的口腔卫生习惯。肥大性龈炎牙龈呈明显的炎性肥大，时间久后牙龈纤维增生，又名增生性龈炎。多见于青少年，好发于前牙唇侧。【诊断】牙龈呈深红色并明显肿胀、肥厚。严重时龈乳头呈球状突起。探查时有龈袋，并有分泌物，严重时可出现单个或多个部位的龈脓肿。诊断时应注意鉴别白血病引起的牙龈肥大及浆细胞性龈炎。【治疗】1. 同慢性龈缘炎的治疗，牙列不齐或咬合异常者，作调合或正畸治疗。2. 炎症重时用3%过氧化氢液冲洗龈袋，袋内涂碘合剂或塞入甲硝唑、螺旋霉素等药膜；形成脓肿者切开引流，并给消炎药物。3. 炎症消退，但牙龈仍未恢复正常者，可作龈切除术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com