

淋菌性口炎_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_B7_8B_E8_8F_8C_E6_80_A7_E5_c22_610012.htm 淋病系性传播疾病，由于接触感染，新生儿、儿童及成年人都可发生淋菌性口炎。【诊断】全口粘膜发红，唾液分泌减少，粘稠度增高。口腔粘膜上有浅溃疡面，盖有黄白色假膜。此种假膜易于擦去，而现出血性创面。新生儿淋菌性口炎多由于新生儿产出时，接触到母体产道淋病损害而受到感染。分泌物涂片，可见大量多形核白细胞及细胞内革兰阴性双球菌。细菌培养有奈瑟淋病双球菌生长。【治疗】1.需夫妇、母子、父子同时治疗。2.青霉素首选，320万单位/日，分2次肌肉注射。同时与丙磺舒或四环素联合用药。为防止四环素对牙的破坏，儿童可选用复方磺胺甲唑(复方新诺明)。四环素可用头孢菌素代替。3.口腔内可用青霉素擦剂或含漱液，也可用复方硼砂溶液，1:5000呋喃西林溶液漱口。溃疡局部用2.5%金霉素甘油或药膜。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com