

单纯疱疹_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8D_95_E7_BA_AF_E7_96_B1_E7_c22_610013.htm 单纯疱疹是由人单纯疱疹病毒，主要是单纯疱疹 型病毒所引起的皮肤和（或）粘膜疾病。临床上有两种类型。【诊断】1.唇疱疹 成年女性多见，具有复发性，可由感冒、发热等诱发。 好发于唇红、口周、鼻翼、颊、颊部皮肤。 首先出现红斑，继之出现成簇细小的小疱、可互相融合、疱液清亮，继之变黄结痂，痂脱落后有暂时性色素沉着。2.疱疹性口炎 多见于6个月~2岁的婴幼儿，多为原发性。 骤然发热，体温逐渐下降后口内出现溃疡。 口内粘膜片状充血，有成簇的浅溃疡(直径i mm2mm)，可互相融合，其表面有淡黄色纤维素膜。 全口牙龈充血水肿，易出血，甚至出现小溃疡，称为疱疹性龈口炎。 成年患者极少牙龈充血，全身反应轻，并可复发，其他同婴幼儿疱疹。3.辅助检查 脱落细胞检查可见有气球状变性、水肿的细胞，多核巨细胞或核内包涵体，用elisa检测病毒，阳性率高。【治疗】1.溃疡面涂2.5%金霉素甘油、疱疹净、0.5%达克罗宁，或以0.2%氯己定(洗必泰)液、0.25%金霉素液、1%普鲁卡因含漱。唇疱疹用0.025%~0.05%硫酸锌湿敷。2.全身用抗病毒类药物，如板蓝根制剂、利巴韦林等。并给予维生素b,c等。反复发作者，可用转移因子、干扰素、左旋咪唑等治疗。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com