

坏死性龈口炎_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_9D_8F_E6_AD_BB_E6_80_A7_E9_c22_610028.htm 在牙龈边缘、龈乳头和口腔粘膜发生坏死的急性炎症，以革兰阴性厌氧梭形杆菌和文生螺旋体为致病微生物。发病部位仅限于牙龈者，称坏死性龈炎，又称文生龈炎。【诊断】1.急性者多见于儿童，龈乳头、龈缘坏死，表面有灰褐色假膜。去除坏死组织和假膜后，可见出血创面，且较平。局部疼痛，易出血，口有恶臭。有时发热，口涎增多，有时带血液。严重者，牙龈迅速坏死，牙槽骨外露，牙齿松动，甚至脱落。颌下淋巴结肿大、压痛，血中白细胞总数轻度增高。2.慢性者，多发生于成人个别牙，龈出血、疼痛、口臭等症状均较轻。【治疗】1.重症可用大量青霉素或口服甲硝哇(灭滴灵)。适当补充b族维生素和维生素c。2.去除局部坏死组织后，用3%过氧化氢或0.2%高锰酸钾液冲洗。涂2%甲紫或1%~2%碘酊，或用甲硝唑药膜贴敷。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com