

智齿冠周炎_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_99_BA_E9_BD_BF_E5_86_A0_E5_c22_610032.htm

智齿冠周炎是指青年男女的下颌第三磨牙（智齿）萌出不全，或萌出受阻时，牙冠周围组织发生的炎症。可分为急性和慢性两种。【诊断】1.急性化脓性冠周炎（1）全身有：发热、恶寒、食欲不振、周身不适等症状；白细胞总数和中性粒细胞数增多。（2）局部有： 下颌第三磨牙牙冠周围粘膜红肿，边缘糜烂，盲袋溢脓，有自发性跳痛。 炎症累及，咀嚼肌时，出现不同程度的张口受限，甚至牙关紧闭。 患侧颌下区淋巴结肿大、压痛。 炎症波及咽侧壁、扁桃体时，可出现吞咽痛。可合并颊间隙、咬肌下间隙等颌周间隙感染。2.慢性冠周炎一般无全身症状。局部症状较轻微，多有： 牙龈轻度红肿，盲袋内少许分泌物。 第一磨牙颊侧前庭沟可有迁延性瘻管。或穿通面颊形成面颊瘻，瘻管经久不愈。 下颌骨体部外侧隆起，张口受限，触诊时局部有硬结感。 x线检查见下颌骨外侧骨膜增厚，有牙周骨质的炎性阴影。【治疗】1.全身治疗 主要使用抗生素。2.局部治疗 3%过氧化氢冲洗盲袋中的食物残屑、细菌及分泌物，而后放入少许3%碘甘油或在盲袋内放置“冠周炎膜片”（第四军医大学口腔医院研制）。 氩氦激光照射。 超短波治疗。 拔除对颌牙或磨除对颌牙尖。 脓肿切开引流。 对牙位正而能萌出者，可切除龈瓣消除盲袋。 不能正常萌出者则应拔除。并发面颊瘻者，在拔除患牙后做瘻管搔刮或切除术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com