

甲状舌管囊肿_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_94_B2_E7_8A_B6_E8_88_8C_E7_c22_610044.htm

胎儿发育第三周时，在口腔底部发生甲状腺舌管，下行至颈部，其下端发生甲状腺。胎儿发育第五周时，甲状腺舌管即退化，其口腔端残留为舌根部的盲孔。如甲状腺舌管退化不全，在颈部中线形成先天性甲状舌管囊肿。【诊断】1. 多见于小儿和青年。颈前舌骨平面下有圆形肿块，表面光滑，界限清楚，囊性感，皮肤无粘连，随吞咽上下移动。沿舌骨方向可触及索状物，张口伸舌时可觉肿块回缩上提。2. 囊肿继发感染时，局部红肿触痛，自行破溃或切开引流后，可形成经久不愈的瘻。3. 粘液性分泌物，常含柱状和鳞状上皮细胞。【治疗】手术治疗，切除囊肿、瘻管和舌骨中段，直达舌盲孔。为便于术中寻找，可注入亚甲蓝染色。合并急性感染者，应先用抗生素控制感染或切开引流，俟炎症消退3个月后手术摘除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com